

タシグナ[®]を服用される方へ お薬服用スケジュール



ふだん服用しているお薬を記入してください

種類	お薬の名前	飲み方
例：血圧の薬	○△カプセル	1日1回 朝食後

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

タシグナ® との飲みあわせに注意が必要なお薬など

主なお薬等の名称	お薬の種類	想定される作用
アゾール系抗真菌剤： イトラコナゾール、 ボリコナゾール等	感染症（真菌）の薬	タシグナ®の作用が強くなる可能性があります。
リトナビル	感染症（HIV）の薬	
クラリスロマイシン	感染症（細菌）の薬	
グレープフルーツジュース	－	
フェニトイン	てんかんの薬	タシグナ®の作用が弱くなる可能性があります。
リファンピシン	結核の薬	
カルバマゼピン	てんかん、 ^{そうつびょう} 躁病などの薬	
フェノバルビタール	不眠症や不安などの薬	
デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤	
セイヨウオトギリソウ (St.John's Wort, セント・ジョンズ・ワート) 含有食品	－	
ミダゾラム	麻酔薬	
イマチニブ	慢性骨髄性白血病、 Ph陽性急性リンパ性 白血病、KIT陽性消 化管間質腫瘍の薬	タシグナ®の作用が強くなる可能性、及び この薬の作用が強くなる可能性もあ ります。
アミオダロン	不整脈の薬	心電図の異常（QT間隔延長）を起こす 可能性があります。
ジノピラミド		
プロカインアミド		
キニジン		
ソタロール		
クラリスロマイシン	感染症（細菌）の薬	タシグナ®の作用が弱くなる可能性があります。
ハロペリドール	統合失調症などの薬	
モキシフロキサシン	感染症（細菌）の薬	
ベプリジル	不整脈、狭心症の薬	
ピモジド	統合失調症などの薬	
プロトンポンプ阻害剤	胃かいようなどの薬	