

キムリアの治療を受けている患者さんへ

キムリア投与後の副作用には、速やかな処置が必要な場合があります。
異常を感じたらすぐに主治医に連絡してください。

注意が必要な
症状

発熱、疲労、頭痛、めまい、意識障害、吐き気、ふるえ、話すことが難しくなる、息切れ、動悸、身体の痛み、発疹、出血、むくみ、下痢、等

移植のためにドナーとして血液、臓器、組織及び細胞を提供しないようにしてください。

氏名	
電話番号	

ノバルティス ファーマ株式会社

KYM00003GK0002
2024年5月作成

キムリア[®]

連絡カード

- ◆ このカードは常に携帯してください。
- ◆ 救急時や診察を受ける際は、必ずこのカードを見せてください。



キムリアの治療を受けていることを
受診する医療機関へお伝えください。

キムリアの治療に関する緊急連絡先

キムリアを投与した医療機関名			
電話番号	代表	時間外	
担当医師名			
キムリアの投与日	年	月	日
キムリア製造ID			

医療関係者の方へ

この患者さんは、CD19陽性細胞を標的とする免疫細胞療法として、CD19キメラ抗原受容体(CAR)をコードする遺伝子を導入した患者由来のT細胞(CAR-T細胞)であるキムリアの投与を受けています。

キムリアによる治療では、特に注意が必要な副作用として、サイトカイン放出症候群(CRS)、神経系事象(免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(ICANS)を含む)、血球減少、腫瘍崩壊症候群などがあらわれることがあります。

この患者さんは、ドナーとして血液、臓器、組織及び細胞をレシピエントに提供することはできません。

緊急時、治療を行う前に、左に記載のあるキムリアの投与を行った施設の担当医師へ連絡してください。

この患者さんに有害事象の発生が疑われるときは、下記ノバルティスダイレクトへもご連絡いただき、有害事象の報告にご協力ください。その際、キムリア製造IDを併せてお伝えください。

ノバルティスダイレクト

TEL : 0120-003-293

受付時間：月～金 9:00～17:30(祝祭日及び当社休日を除く)